Organizzazione / Organization



SEDE

SEDE SECONDARIA

Via Massa, 16 - 38063 AVIO (TRENTO) Tel. 0039 0464 685091 Via Rivo Rocca Chiesa, 21/2 - 16010 SERRA RICCÔ (GENOVA) Tel. 0039 010 752521 - Tel. 0039 010 752356

info@fopitalia.it www.fopitalia.it

In collaborazione con / Collaboration with













CSSV Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano - Verbania (VB)



Si ringraziano in particolar modo i seguenti sostenitori / Special Thanks

Banca del Piemonte S.p.A. G.S.I. Gruppo Servizi Informatici V.C.O. Informitalia S.r.I. Leonardo Italia Restauri Pubbliverbano Service S.r.I. Puntolinea S.n.c. V.C.O. Formazione Pasticceria «Gli Amici di Caterina»

e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del convegno.

MEETING CON ACCREDITAMENTO E.C.M. (Educazione Continua in Medicina)

L'ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE SARÀ RILASCIATO ESCLUSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DEI LAVORI - ALLE ORE 13.00 - A COLORO I QUALI NE AVRANNO FATTO RICHIESTA AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE






SALA MEETING



28921 VERBANIA - Via Fratelli Cervi, 14

PAOLA: 49 aa

- ✓ Pz giunta alla nostra osservazione nel 2002 (all'età di 41 anni)
- ✓ Malattia in rapida progressione
- ✓ Episodi di riacutizzazione ogni 1-3 mesi con tumefazione parti molli, dolore per alcune settimane
- ✓ Esiti inevitabili in nuove calcificazioni muscolari
- ✓Nei precedenti 6-9 mesi trattata con bisfosfonati (etidronato 400 mg/die e alendronato 70 mg/settimana) senza beneficio
- ✓ Nelle fasi di acuzie trattata con alte dose di steroide (prednisone 50 mg/die)
- ✓ Riacutizzazioni ad ogni tentativo di scalare lo steroide




PAOLA: 49 aa


- ✓ Febbraio 2008 avviata terapia con rosiglitazone (4 mg per 6 mesi poi 8 mg/die)
- ✓All'inizio del trattamento la paziente deambulava a fatica e per piccoli passi
- ✓ Incapace di alimentarsi da sola e di portare la mano alla bocca
- ✓ Nell'anno precedente 5 episodi di riacutizzazione

RISULTATI


	PRIMA	24 mesi TERAPIA
ALP (U/L)	86	44
B-ALP (U/L)	44	22
N° FLARES	5	0
ALTEZZA (cm)	155,3	157,7
OCCIPITE-MURO (cm)	25	22
FLEX TIBIO-TARSICA (°)	0	25
LUNGHEZZA DEL PASSO (cm)	25	41




PRIMA



24 MESI TERAPIA



24 MESI TERAPIA



PAOLA: 49 aa

- ✓ La paziente ha potuto ridurre la dose di steroide (da oltre un anno 5 mg/die) senza riacutizzazioni
- ✓ Anche in occasione di infezioni e traumatismi non si sono verificate ricadute (riacutizzazioni: 0 in 2 anni di rosiglitazone contro 5 dell'anno antecedente la terapia)

